

出席停止となる感染症について 長野養護学校

【学校において予防すべき感染症の一覧表】

分類	感染症名	出席停止の期間	提出用紙
第1種	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症	治癒するまで	治癒証明書 (<u>医師記入</u>)
第2種	インフルエンザ	発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで	治癒報告書 (<u>保護者記入</u>)
	百日咳	特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで	治癒証明書 (<u>医師記入</u>)
	麻疹(はしか)	解熱後、3日を経過するまで	
	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	耳下腺顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過しかつ全身状態が良好になるまで	
	風しん(三日ばしか)	発疹が消失するまで	
	水痘(水ぼうそう)	すべての発疹が痂皮化するまで	
	咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、咽頭炎・結膜炎などの主要症状消退後2日を経過するまで	
	新型コロナウイルス感染症	発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 【ほほえみ教室】 発症した後7日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで	出席停止期間 終了報告書 (<u>保護者記入</u>)
	結核	病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで	治癒証明書 (<u>医師記入</u>)
	髄膜炎菌性髄膜炎		
第3種	コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎(A型)、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎)	病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで	治癒証明書 (<u>医師記入</u>)

インフルエンザ出席停止期間早見表

《出席停止期間》

・発症した後5日を経過し、かつ解熱後(平熱に下がった日を0日として)2日を経過するまで

0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
発症	解熱	出停	出停	出停	出停	登校可		
発症	発熱	解熱	出停	出停	出停	登校可		
発症	発熱	発熱	解熱	出停	出停	登校可		
発症	発熱	発熱	発熱	解熱	出停	出停	登校可	
発症	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	出停	出停	登校可

新型コロナウイルス出席停止早見表

《出席停止期間》

・発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

※症状軽快とは、熱が平熱に下がり、咳やのどの痛みなどが軽快している状態のことを言います。

	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
症状あり	例1 発症	出停	出停	出停	出停	症状 軽快	出停	登校可	
	例2 発症	出停	出停	出停	症状 軽快	出停	登校可		
	例3 発症	出停	出停	症状 軽快	出停	出停	登校可		
	例4 発症	出停	出停	出停	出停	出停	症状 軽快	出停	登校可
症状なしの 検査陽性	検体採取日	出停	出停	出停	出停	出停	登校可		

ほほえみ教室 新型コロナウイルス出席停止早見表

《ほほえみ教室出席停止期間》

- 「ほほえみ教室」においては、重症化リスクもあることから、発症した後7日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

※症状軽快とは、熱が平熱に下がり、咳やのどの痛みなどが軽快している状態のことを言います。

[illegible]